



Christine Felding
Gynækolog
Rungsted Bytorv 1- 2960 Rungsted Kyst
TLF: 4817 6250 FAX: 4817 7516
CVRnr: 18826038

PATIENTINFORMATION

MARSUPIALISATION (behandling af bylder i skedeåbningen)

Hvornår foretages indgrebet?

I skedeåbningen sidder der i hver side en kirtel – Bartholins kirtel. Hvis der kommer betændelse i den, kan der opstå en byld, som skal opereres.

Information & samtykke

Patienten er informeret om indikationen for undersøgelsen, selve proceduren og om risikoen for efterfølgende blødning og gendannelse af bylden. Patienten har givet mundtligt samtykke til at indgrebet udføres.

Bedøvelse

Der anlægges lokalbedøvelse i området over bylden med 'tandlægesprøjten'.

Procedure

Der udkæres et ovalt låg på bylden og udtømmes rigelige mængder pus. Der skylles med saltvand og hulrummet gennemgås digitalt. Med fire sting (Vicryl 2-0) sys bunden af hulrummet til kanten. Evt. ilægges en lille meche, som kan sidde indtil den falder ud.

Plan

Pt skal sædesæbebad 3x 20 min dgl i den næste uge.

Efterkontrol ikke nødvendig.

August 2012

Gynækologerne på Rungsted Bytorv