



Christine Felding
Gynækolog
Rungsted Bytorv 1- 2960 Rungsted Kyst
TLF: 4817 6250 FAX: 4817 7516
CVRnr: 18826038

HSU

Hystero-salpingo-ultrasonografi (Ultralydsvejledt undersøgelse af æggeledeerne)

Formål:

At undersøge om der er passage i dine æggeledere. Sædcellerne skal kunne passere ud i æggeledeerne, og det befrugtede æg transporteres tilbage til livmoderen. Undersøgelsen vil også skylle æggeledeerne igennem så passageforholdene bedres, evt. normaliseres.

Gør det ondt?

Der kan opleves mindre menstruationssmerter, men som regel kun, hvis der er forhindringer i æggeledeerne. Ved normale forhold er undersøgelsen ganske smertefri.

Hvornår er det bedste tidspunkt for undersøgelsen?

Efter menstruationen og før ægløsningstidspunktet dvs. ca. 5. – 11. dagen efter menstruationens start.

Hvordan udføres undersøgelsen?

Vi anbefaler, at du hjemmefra tager 1 gram Panodil (2 tabletter à 500 mg), hvis du er nervøs eller tidligere har haft infektion med f. eks. Chlamydia.

I gynækologisk leje fortages afvaskning af livmoderhalsen. Herefter indføres et tyndt og blødt plastikrør (kateter) gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen. For at kateter ikke skal falde ud ved undersøgelsen, fyldes luft i en lille ballon, som sidder i spidsen af kateteret.

Ultralydsskanning forgår gennem skeden, medens lægen sprøjter væske (lokalbedøvelse) og luft igennem kateteret. Væsken løber ud gennem æggeledeeren og kan ses som væskeophobning bag livmoderen, hvis der er fri passage i æggeledeerne. Undersøgelsen tager ca. 5-10 minutter.

Kan jeg gå på arbejde bagefter og have et normalt sexalliv?

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt og en del af afvasknings- og gennemskylningsvæsken kan løbe ud af skeden. Du kan gå på arbejde. Du kan have normalt samliv før og efter undersøgelsen.

Oktober 2016 revideres senest oktober 2019

Gynækologerne på Rungsted Bytorv

Version 2