



Christine Felding
Gynækolog
Rungsted Bytorv 1- 2960 Rungsted Kyst
TLF: 4817 6250 FAX: 4817 7516
CVRnr: 18826038

HYSTEROSKOPI

(kikkertundersøgelse af livmoderen)

Denne undersøgelse foretages, hvis du for eksempel har blødningsproblemer eller problemer med at blive gravid.

Før du kommer til undersøgelsen.

Undersøgelsen kan **ikke** foretages, hvis du er gravid. Derfor er det vigtigt at bruge prævention, hvis du skal undersøges senere end 12 dage efter første menstruationsdag.

Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har svært ved at blive gravid, er det vigtigt, at du **ikke har menstruation**.

Hvis du får menstruation omkring undersøgelsesdagen, beder vi dig ringe til os så tidligt som muligt for at aftale en anden tid.

Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har blødningsproblemer, kan den gennemføres, selv om du bløder – blot det ikke er for kraftigt.

Hvordan foregår undersøgelsen.

Undersøgelsen foregår ved, at lægen fører et lille kikkertinstrument med en diameter på 5 mm gennem skeden op i livmoderhulen. For at få et godt billede gennem kikkerten bliver livmoderhulen skyllet med vand. I kikkerten kan man få et billede af livmoderens indvendige slimhinde. Undersøgelsen tager 5-10 minutter og foregår som regel uden bedøvelse.

Efter undersøgelsen.

Du kan have let blødning og lette mavesmerter efter undersøgelsen. For dette får du smertestillende tabletter.

Efter du er kommet hjem.

Du kan forvente let blødning nogle dage efter undersøgelsen afhængigt af, hvad der er foretaget.

Svar på undersøgelsen.

Hvis der er fjernet væv eller taget en vævsprøve, skal du efter ca. 2 uger ringe til klinikken for svar på mikroskopi af det væv, der er taget ud.

Gynækologerne på Rungsted Bytorv

Oktober 2016