



Christine Felding
Gynækolog
Rungsted Bytorv 1- 2960 Rungsted Kyst
TLF: 4817 6250 FAX: 4817 7516
CVRnr: 18826038

LABIUMREDUKTION

(formindskelse af de små kønslæber)

Reduktion af de små kønslæber tilbydes, hvis de er meget store og generer ved sportsudøvelse, f.eks. ridning eller cykling, samt ved sex. Indgrebet foretages ikke af kosmetiske årsager; jvnf. Straffelovens § 245a.

Indgrebet foretages i lokalbedøvelse. Det kan være ubehageligt at få anlagt lokalbedøvelse i de små kønslæber, men det er hurtigt overstået. Herefter fjernes et passende stykke, hellere for lidt end for meget, hvorefter såret lukkes med en tråd, som forsvinder af sig selv. Trådene kan dog fjernes efter 5 dage, hvis stingene generer.

De første 1-2 døgn efter operationen og derefter ved behov anbefales "isbind", som skal være gjort klar på forhånd. Gode, tykke bind (uden vinger), fugtes og lægges i fryseren, for derefter at anbringes på såret (med mellemlæg af papir eller tyndt stof). Kulden virker smertestillende og afhævendende, og forhindrer blødning. (Frosne ærter, brun sæbe eller 'det blå' til øjenlågene kan også bruges). Det første isbind får du hos os. Som smertestillende i øvrigt plejer Panodil at være rigeligt.

Enkelte oplever blødning fra operationsstedet i efterforløbet. Sker det i gynækologens åbningstid, henvender du dig selvfølgelig der, ellers må du tage på dit lokale sygehus og blive undersøgt. Infektion i området er sjælden.

Efterkontrol er ikke nødvendig. Den eneste komplikation på lang sigt er, hvis der er taget for meget af, og der dermed kan forekomme generende ardannelse.

Rungsted november 2016
Christine Felding

version 2

Revideres senest november 2019